

واکسن‌ها در کاهش مرگ و میر و پیشگیری از وخامت وضعیت بیماری تاثیر چشمگیر دارد ولی در عین حال درصد قابل قبولی هم از مبتلا شدن پیشگیری می‌کند، در عین حال علیرغم تزریق دو دوز واکسن کرونا دوباره مبتلا شدن به این ویروس موضوع عجیبی نیست در حالی که به میزان قابل توجهی در صورت ابتلا از مرگ و میر پیشگیری خواهد کرد.

رعایت پروتکل‌ها و واکسیناسیون تنها راه مقابله است

در ستاد ملی کرونا مقرر شد محدودیت‌ها با کارت واکسن صورت بگیرد، یعنی آن دسته از افرادی که کارت واکسن دریافت کردند، می‌توانند در محیط‌های سر بسته با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی حضور یابند. حضور افراد در مکان‌هایی مثل مدارس، سینماها، باشگاه‌ها و حمل و نقل بین جاده‌ای مثل هواپیما، اتوبوس و قطار باید در سامانه امید و با ارائه کارت واکسن انجام شود. با توجه به این موضوع اما هنوز افرادی هستند که واکسن دوز اول را نزدند.

از طرفی خیلی از کشورهای جهان درگیر سویه جدید کرونا شدند که هم اکنون توسط سازمان بهداشت جهانی بنام امیکرون شناخته می‌شود، بر اساس شواهد اولیه ارائه شده نشان می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری کوید ۱۹ در نوع امیکرون بیشتر است، یعنی افرادی که پیش از این به بیماری کوید ۱۹ مبتلا شده اند نیز ممکن است به گونه اومیکرون آلوده شوند.

ضرورت اقدامات پیشگیرانه از جمله استفاده از ماسک،

حفظ فاصله گذاری اجتماعی و حضور نیافتن و انجام واکسیناسیون یکی از راه های اساسی پیشگیری محسوب می شود، سرعت انتشار به گونه‌ای فزاینده افزایش می یابد که در عرض یک هفته موارد ابتلا دو برابر شده و به صورت تصاعدی بالایی رود که این نشان دهنده این است که قابلیت بیماری زایی آن نسبتا بالا است.

بیش از ۴۰۰ هزار نفر واکسن تزریق کردند

دکتر محمد موقری، معاون بهداشت و درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان، در این رابطه بیان کرد: از ابتدای طرح واکسیناسیون تا کنون ۴۱۴۲۰۰ دوز واکسن کرونا به جمعیت هدف (افراد بالای ۱۲ سال) تزریق شده است که نزدیک به ۸۲ درصد دوز اول و ۶۹ درصد دوز دوم و ۴۵۰۰ نفر دوز سوم را دریافت کرده اند و نزدیک به ۴۷ هزار نفر از جامعه هدف واکسن تزریق نکردند.

او در ادامه افزود: با توجه به اینکه دو رفتار مهم سلامتی، یعنی واکسیناسیون به موقع و رعایت شیوه نامه های بهداشتی تاثیر بسزایی در پیشگیری از ابتلا، بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا داشته است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی به همشهریان توصیه کرد: به منظور پیشگیری از چرخش و انتقال ویروس در سطح جامعه، ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی (استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شست و شوی دست و توجه به تهویه محیط های بسته و ...) هر چه سریعتر به مراکز واکسیناسیون مراجعه نمایند. تا قبل از اینکه با موج دیگری مواجه شویم مردم همگی ایمن شوند.

